

I CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE VETERINARIOS DE PORCINO

ZARAGOZA DEL 5 AL 6 DE NOVIEMBRE 2008

TALLERES

CÓMO HACER LA REPOSICIÓN

CARLOS MARTÍNEZ DÁVILA



¿Cómo hacer la reposición?

CARLOS MARTINEZ DAVILA



REPOSICIÓN

- Altas reproductoras.
- Bajas reproductoras (desvieje).

DESVIEJE

- Casos especiales: explotaciones de genética, aumento de capacidad, circunstancias sanitarias.
- Bajas rutinarias.

DESVIEJE

- Valores de 30-50%, según pautas de cada empresa.
- Establecer objetivos en función del valor óptimo de rentabilidad. Destetados: 30-50.
- Causas: reproductivas, ciclo, locomotoras, bajo rendimiento, muerte, patologías, ubre ...

DESVIEJE

- Disponer de la suficiente cantidad de cerdas jóvenes.
- Control de días no productivos.
- Animales con niveles de producción inferiores a la media de la explotación.


DESVIEJE

EQUILIBRIO:

- Cerdas de muchos ciclos: tamaño de lechón, problemas de aplomos u otras patologías, mamas.
- Cerdas demasiado jóvenes: incremento coste de reposición y posibles riesgos sanitarios.

Estructura explotación: "Lion couchant".


perfil explotacion



REPOSICION

Las cerdas tras su primer ciclo deberían estar en el grupo de cerdas con mejor producción de la explotación o próximo a éste.

Invertir en valores seguros...

ROBIND


...garantía de éxito.

- Alta velocidad de crecimiento
- Alta robustez de la progenie
- Excelente índice de conversión

PIC España, presenta al **Verraco Robusto e Industrial ROBIND**, una apuesta segura de futuro, un producto de una alta rentabilidad demostrada.

Este verraco, es un animal negativo al gen del estrés, ofrece el mejor equilibrio entre rendimiento en granja (alta velocidad

de crecimiento con excelentes índices de conversión) y producción de canales de calidad.

Su progenie muestra una robustez bien contrastada en condiciones comerciales adversas, con resultados de menor dispersión en los engordes.



Tecnología, experiencia y calidad del líder mundial en genética porcina.

Tasas de renuevo de 35-45% del censo al año.

% de cerdas de 1º ciclo de 16-18%

REPOSICION

- Sanidad.
- Instalación.
- Manejo.
- Genética.
- Nutrición.

NUTRICION

30-110kgs

- Formulación específica según etapa de desarrollo: 30-70-110 (niveles de proteína y lisina decrecientes, y altos de CA y P).
- Fórmulas de cebo usadas en la empresa.

-RENTABILIDAD.

-MEDIO AMBIENTE.

NUTRICION

Determinación de las necesidades:

- Factores intrínsecos: origen genético (misma raza hasta 22%), **sexo**, **peso**.
- Factores extrínsecos(afectan sobre todo a la capacidad de ingestión): **enfermedad**, **densidad**, **tipo instalación ...**

GENÉTICA

- Elegir el tipo genético más rentable para la empresa?
- Seguir el programa de cruzamientos fijado por la firma de genética.

GENETICA

-Control de rendimientos.

-BLUP.

SANIDAD

Objetivo

“ Equilibrio inmunitario”

- Prevención.
- Control.

SANIDAD

- Parásitos.
- Bacterias.
- Virus.

PARASITOS

Ectoparásitos.

Endoparásitos.

Programa preventivo: Avermectinas,
Benzoimidazoles...

BACTERIAS

- APP.
- MICOPLASMA.
- RINITIS.
- SALMONELLA.
- DISENTERIA.
- ILEITIS.
- MAL ROJO.
- LEPTOSPIRA.

VIRUS

- CIRCOVIRUS.
- PRRS.
- INFLUENZA.
- PARVOVIRUS.
- ROTAVIRUS.
- CORONAVIRUS.

INSTALACION

Contribuirá al óptimo desarrollo de los animales hasta su edad reproductiva.

INSTALACION

- Comedero y bebedero.
- Suelo.
- Ventilación.
- Zona entrada reposición.
- Box.
- Estación electrónica.

MANEJO

Quizás el más determinante y con el que se pueden suplir carencias del resto de factores que interactúan sobre las cerdas de reposición.

MANEJO

- Maternidad.
- Transición.
- Recría.
- Entrada explotación.

D - C L O P R O S T E N O L

COMPOSICIÓN POR ML: (d)-Cloprostenol como (d)-Cloprostenol de sodio, 0,075 mg; Excipiente, c.s.p., 1 ml; INDICACIONES: VACAS, CERDAS Y YEGUAS: Inducción del parto y sincronización en vacas. Inducción del parto en vacas, cerdas y yeguas. Inducción del estro en la yegua. Distorsión ósea en el cuerpo lúteo. Inestabilidad en el parto: cario, ecléptico, ciclo irregular, ciclo sin ovulación, cuerpo lúteo persistente, quistes lúteales. Endometritis, piometra. Interrupción de la gestación durante la primera mitad, modificación fetal. Metropatía postparto. Involución uterina retardada. Terapia combinada de quistes foliculares (10-14 días después de la administración de GnRH o hCG). VIA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular. POSOLOGÍA: 1 ml/animal. CONTRAINDICACIONES: Evitar el tratamiento de animales gestantes a menos que se quiera provocar el aborto o el parto. TIEMPO DE ESPERA: VACAS: Carne: 0 días. Leche: 0 horas. CERDAS: Carne: 1 día. YEGUAS: No administrar a yeguas cuya carne se destine a consumo humano. PRESENTACIONES: Viales con 10, 20 ml y envases con 5 viales de 20 ml. REG. N.º: 1.752/SEP.

