

















INFECCIÓN EXPERIMENTAL DE LA NUEVA VARIANTE H1N1 EN EL CERDO

TRABAJO REALIZADO EN: (VLA, CANADA, USDA)

CUADRO CLÍNICO SEMEJANTE OTRAS GRIPE. MODERADA MORBILIDAD Y NO MORTALIDAD

INFECCIÓN DETECTADA A LAS 24 HORAS, PICO DE 3 A 5 DÍAS.

NO TRANSMISIÓN A AVES (PAVOS??). SI TRANSMISIÓN ENTRE PORCINOS.

VIRUS SOLO EN TRACTO RESPIRATORIO. DEMAS ÓRGANOS Y TEJIDOS NEGATIVOS. NO VIREMIA O INSIGNIFICANTE.

Protección cruzada con alguna vacuna: Gripovac y Respirovac

LA REALIDAD DE LA NUEVA GRIPE 2009


- ESTABILIZADA BAJA VIRULENCIA. C. Sur ya paso el invierno sin complicaciones.
- ALTA MORBILIDAD. COMO TODAS LAS GRIPE. MAS SIN Ac.
- RESPONDE BIEN TRATAMIENTOS
- SERÁ LA CEPA PREDOMINANTE en el FUTURO.
- EL MIEDO ES EL PROBLEMA

Enfermedades Emergentes del cerdo





POSSIBLE TRANSMISSION OF NIPAH VIRUS

The pig is the main reservoir for Nipah virus. The virus can be transmitted to humans through direct contact with infected pigs or through intermediate hosts like horses and dogs.

ETEC (Enterotoxigenic Escherichia coli) is a common cause of diarrhea in pigs.





The image illustrates the economic impact of the PPA, showing a pig, a Euro coin, and a map of Africa.



Cómo se hace ??

Análisis de riesgo
 Qué Enfermedad y por donde puede entrar ?
 Utilización de Centinelas
 Métodos de diagnóstico sensibles: PCR y Serología
 Alteración de Parámetros productivos
 Fiebre: Cámaras térmicas
MAS ATENCIÓN AL CAMPO. EDUCACIÓN CONTINUADA


ENFERMEDADES APARECIDAS EN LA UE EN LOS ULTIMOS AÑOS



PPC
 FA
 LA
 PPA
 IF AV
 EVC
 Etc



DETECCIÓN EN CAMPO ????

2 a 4 meses



Muestras llegan al laboratorio
Los VIERNES a las 12,00

Excelentes y rápidos métodos



4 horas

